

Lyhytkuonoisten rotujen hengitystieoireyhtymän luokitusohje (BOAS-ohje)



Kennelliiton hallituksen 6.10.2022 hyväksymä. Voimassa 1.1.2023 alkaen.

Tämä ohje täydentää Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelman sääntöä (valtuusto 26.11.2023) ja Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelman ohjetta (PEVISA-ohje, hallitus 24.11.2023).

1 Yleiset määräykset

Lyhytkuonoisten rotujen hengitystieoireyhtymän (*brachycephalic obstructive airway syndrome*, BOAS) luokitusohjeen avulla arvioidaan oireyhtymän aiheuttamien hengitystieoireiden vakavuutta ja koirien rasituksensietoa.

Luokitteluun käytettävä testi sisältää koiran kliinisen tutkimuksen sekä rasitusosion. Koirasta mitataan ja arvioidaan sen BOAS-aste, sierainten ahtauma ja kuonon piteuden suhde kallonpituuteen sekä rasituksenkesto/palautuminen. Kennelliitto hyväksyy virallisiksi tämän ohjeen mukaiset testit sekä niiden tulokset.

Testi on suoritettava koiran omistajan kotimaassa tai Suomessa.

Tuontikoirista, ulkomaisista jalostuskoirista ja tuontisperman osalta Kennelliitto hyväksyy testaustulokset erillisellä päätöksellä. Testituloksesta tulee käydä ilmi, että koira on ollut tunnistusmerkitty tutkimushetkellä.

2 Osallistumisoikeus ja voimassaolo

Testi on tarkoitettu lyhytkuonoisille roduille, joissa esiintyy ylähengitysteiden ahtauman aiheuttamia oireita. Kennelliitto päättää ja pitää [listaa roduista](#), joilla on osallistumisoikeus testiin.

Testiin voivat osallistua vähintään 18 kuukauden ikäiset koirat, jotka täyttävät Kennelliiton voimassa olevat tunnistusmerkintä- ja rokotusmääräykset. Tunnistusmerkintä on aina tarkastettava testauksen yhteydessä. Alle kaksivuotiaalle koiralle tehty testi on voimassa vuoden.

Testiin ei saa osallistua

- koira, jolla on hengitysvaikeuksia
- koira, jonka hengitysteitä on korjattu kirurgisesti
- sairas koira
- narttu alle 30 vrk ennen synnytystä tai alle 75 vrk synnytyksen jälkeen.

Testissä noudatetaan Kennelliiton antidopingsääntöä sekä yleistä jääviyssääntöä.

3 Testausmenettely

Kennelliitto nimeää eläinlääkärit, jotka voivat valvoa testin.

Valvova eläinlääkäri päättää koiran alkututkimuksen perusteella voiko koira osallistua testiin. Valvova eläinlääkäri voi myös eläinsuojelullisin perustein keskeyttää testin. Koira kuitenkin testataan aina omistajan vastuulla.

Testi tehdään tätä ohjetta täydentävän Lyhytkuonoisten rotujen hengitystieoireyhtymän testin järjestämisohjeen mukaisesti.

Rasitusosiossa vaadittava kävelymatka on 1000 metriä, joka tulee suorittaa 12 minuutissa. Poikkeukset enimmäisaikaan ja kävelymatkaan on kirjattu [rotulistaan](#).

4 Testin tulokset

Testin tulokset määräytyvät valvovan eläinlääkärin päätöksellä.

4.1 Rasitusosio

Rasitusosion tulos	Selite
Hyväksytty	Koira kävelee/ravaa vaaditun matkan vaaditussa ajassa ja palautuu siitä riittävästi palautumisajan kuluessa. Palautumisajan jälkeen ruumiinlämmön ei tarvitse vastata alkulämpöä, jos koiran tila on muuten täysin normaali ja eläinlääkäri katsoo sen palautuneeksi. Ruumiinlämpö ei kuitenkaan saa olla missään vaiheessa mitattuna yli 39,5 °C.
Hylätty	Koiralla on eläinlääkärin suorittaman alkuarvioinnin perusteella merkkejä hengenahdistuksesta (dyspnea), limakalvojen sinerryksestä (syanoosi) tai liikalämpöisyydestä (ruumiinlämpö yli 39,3 °C). Ruumiinlämpö nousee missä tahansa testin vaiheessa yli 39,5 °C. Eläinlääkäri keskeyttää käynnissä olevan testin hengitystieoireiden vuoksi. Koira ei suoriudu testistä ja/tai palaudu riittävästi vaaditussa ajassa. Koiraa on jouduttu palautumisaikana viilentämään eläinsuojelullisin perustein muutoinkin kuin juottamalla.
Keskeytetty	Eläinlääkäri havaitsee koirassa jonkin muun näkyvän sairauden tai oireen, joka kokonaan estää koiraa osallistumasta testiin tai estää testin jatkamisen sen jo alettua. Testi keskeytetään koiran omistajan tai kävelyttäjän toimesta.

4.2 Muut tulokset

BOAS-aste ja sierainten ahtauman aste luokitellaan järjestämisohjeen liitteiden 1 ja 2 mukaisesti.

Kuonon pituuden suhde kallon pituuteen (*cranio facial ratio*, CFR) mitataan.

5 Testin uusinta

Hylätyn rasitusosion jälkeen testin voi uusia kerran. Keskeytetyn rasitusosion voi uusia kaksi kertaa.

6 Poikkeustapaukset

Kennelliiton jalostustieteellisellä toimikunnalla on oikeus erittäin painavista syistä yksittäisessä poikkeustapauksessa myöntää erivapaus tämän ohjeen määräyksistä.