

Liite 2.

Kliinisen tutkimuksen perusteella tehtävä Brachycephalic Obstructive Airway Syndrome (BOAS) -luokitus (Lilja-Maula ym. 2017, perustuen Liu ym. 2015)

	BOAS-aste ^a			
	BOAS-		BOAS+	
	0	1 ^b	2 ^b	3
Ylähengityssäät^c levossa 0 = ei kuuluvissa 1 = lievät 2 = kohtalaiset 3 = selvästi äänekkäät	0	0-1	1-2	2-3
Ylähengityssäät^c liikunnan jälkeen 0 = ei kuuluvissa 1 = lievät 2 = kohtalaiset 3 = selvästi äänekkäät	0	1-2	1-2	2-3
Hengitystyyppi levossa 0 = normaali 1 = käyttää hengityksen apulihaksia ^d	0	0	0-1	1
Hengenahdistusta tai limakalvojen sinerrystä levossa 0 = ei havaittavissa 1 = havaittavissa	0	0	0	0-1

^aBOAS-oireiden aste: 0 = ei oireita; 1 = lievät, 2 = kohtalaiset, 3 = vakavat oireet.

^bKoira saa kokonaisarvioksi seuraavan BOAS luokan, jos sen kaikki oireet ovat ylärajoilla.

^cIlman auskultaatiota kuuluvat hengityssäät.

^dApulihasten käyttö ilmeistä: näkyy voimistuneena sierainten, rintakehän ja vatsan liikkeinä.

Koiran BOAS-oireiden aste (0, 1, 2 tai 3) merkitään kävelytestilomakkeeseen.